

Acetium®

Suojaa vatsasi!

WHO määritteli lokakuussa 2009 alkoholijuomien sisältämän sekä alkoholista elimistössä muodostuvan asetaldehydin ensimmäisen luokan karsinogeeniksi ihmiselle. Vaarassa ovat erityisesti ne, joilla on joko helicobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama mahalaukun limakalvovaurio (atrofinen gastriitti) ja siitä johtuva hapoton maha. Hapottomassa mahassa suun mikrobit pystyvät elämään ja tuottamaan juomien tai ravinnon alkoholista ja myös ravinnon sokereista asetaldehydiä. Lääkkeilläkin aikaansaatu hapoton maha samoin kuin mahalaeikkauskin aiheuttaa asetaldehydialtistuksen. Myös helicobakteerit pystyvät tuottamaan asetaldehydiä paikallisesti. Hapottoman mahan aiheuttava atrofien gastriitti ja helicobakteeri-infektio voidaan luotettavasti todeta verinäytteestä GastroPanel-tutkimuksella

Lue lisää osoitteessa www.gastropanel.net

Hapoton maha ja helicobakteeri-infektio ovat mahasyövän tärkeimmät riskitekijät. Hapoton maha lisää myös ruokatorvisyövän riskiä.

Lue lisää osoitteessa www.biohit.fi / Diagnostiikka

Riskiryhmiin kuuluu yli viisi prosenttia suomalaisista. Kuulutko Sinä? Testaa asetaldehydialtistuksesi osoitteessa: www.acetium.fi/testi



BIOHIT

Innovating for Health

Biohit Oyj Laippatie 1, 00880 Helsinki • Puh. +358 9 773 861 • Faksi +358 9 773 86 204
acetium@biohit.com • www.biohit.fi • www.biohit.com • www.acetium.fi

saatavana vain
apteekeista