

POTILASOHJE – GASTROPANEL-TUTKIMUS

Teille on suunniteltu tehtäväksi GastroPanel-tutkimus.

Ennen tutkimusta teidän olisi huomioitava seuraavat asiat:

- Ennen tutkimusta tulisi olla vähintään neljä tuntia syömättä, juomatta ja tupakoimatta
- Tutkimus **ei** edellytä säännöllisen lääkityksen lopettamista. Mikäli kuitenkin käytätte joitakin seuraavista lääkeaineista, eikä tauko (10 vrk) tule kysymykseen, tulee niistä (lääke ja mahdollinen tauko) ilmoittaa näytteenottajalle sillä käyttö saattaa vaikuttaa laboratorioarvoihin:

PROTONIPUMPUN ESTÄJIÄ (PPI-lääkkeet):

Esomepratsoli; ESOMEPRAZOL ORION, ESOMEPRAZOL RATIOPHARM, ESOMEPRAZOL SANDOZ, NEXIUM, NEXIUM 10 mg enterorakeet
oraalisuspensiota varten.

Lansopratsoli; GASTERIX, LANSOPRAZOL ACTAVIS 15 mg, ZOLT

Omepratsoli; LOSEC, LOSEC MUPS, OMEPRAZOL ACTAVIS, OMEPRAZOL PENZA, OMEPRAZOL RATIOPHARM, OMEPRAZOL SANDOZ, OMESTAD

Pantopratsoli; PANTOPRAZOL ACTAVIS, PANTOPRAZOL PENZA 20 mg enterotabletti, PANTOPRAZOL PENZA 40 mg enterotabletti, PANTOPRAZOL SANDOZ, PANZOR, SOMAC CONTROL, SOMAC enterotabletti, SOMAC injektiokuiva-aine, liuosta varten.

Rabepratsoli; PARIET

Lisätietoja:

Biohit Laboratoriopalvelut

Puh. +358 400 603 222

06022017